

TEST DEL ALIENTO PARA DETECTAR HELICOBACTER PYLORI

***PARA OBTENER UN RESULTADO FIABLE LE ROGAMOS SIGA
LAS SIGUIENTES INDICACIONES***

CONSIDERACIONES PREVIAS

- La prueba debe realizarse por la mañana y en ayunas (tanto alimentos como de bebidas) desde la noche anterior durante un mínimo de 8 horas.
- Abstenerse de fumar al menos 8 horas antes de la realización de la prueba.
- Durante el mes anterior al test NO TOMAR tratamiento antibiótico, siempre consultando previamente a su médico.
- Durante los 15 días previos NO TOMAR OMEPRAZOL, LANSOPRAZOL, ESOMEPRAZOL, PANTOPRAZOL, RABEPRAZOL... u otro inhibidor de la bomba de protones o con sales de bismuto, siempre consultando previamente a su médico.
- Si está permitido tomar ranitidina, cimetidina, famotidina, nizatidina, ...almox y medicación crónica como son los tratamientos para colesterol, diabetes, tiroides, tensión
- Si está permitido lavarse los dientes.
- Si está permitido beber agua sin gas (1 ó 2 vasos) durante la prueba.
- Informe a su médico si:
 - Ha sufrido una extirpación parcial de su estómago (gastrectomía).
 - Está embarazada o en periodo de lactancia.

Observaciones: La prueba dura 40 minutos

- Si vomita durante la prueba debe comunicarlo al personal de laboratorio ya que sería necesario la repetición de la misma (se necesitará un nuevo volante de prescripción).